Тенденции в разпространението на трихинелозата при дивите свине (*Sus scrofa)* в България за периода 2012-2017 г.

Доц. д-р Николай Лалковски
НДНИВМИ, БАБХ

- Трихинелозата е зооноза, разпространена по целия свят. Хората се заразяват, като консумират сурово или недостатъчно термично обработено заразено месо от диви и домашни месоядни и всеядни животни, инвазирани с ларви на нематоди, принадлежащи към род *Trichinella.*





БИОЛОГИЧЕН ЦИКЪЛ



Всички познати видове могат да инвазират човека.

- В Европа основно два вида трихинели причиняват трихинелоза – *Trichinella britovi* и *Trichinella spiralis.*
- *В България основният етиологичен агент при дивите свине е Trichinella britovi (от 92 диви прасета този вид е установен при 90).*

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 2017 ONLINE FIRST
ISSN 1311-1477; DOI: 10.15547/bjvm.2038

Original article

SPECIES COMPOSITION OF *TRICHINELLA* IN DOMESTIC AND WILD ANIMALS IN BULGARIA

N. LALKOVSKI
National Diagnostic and Research Veterinary Medical Institute, Sofia, Bulgaria

Диагноза

11.8.2015 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 212/7

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1375 НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2015 година

относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (*Trichinella*) в месото



Разпространение на трихинелозата при дивите свине за периода 2012-2017 г.

година	брой инвазирани
2012	75
2013	79
2014	81
2015	89
2016	64
2017	112

Разпространение на трихинелозата при дивите свине за периода 2012-2017 г.



Разпространение на трихинелозата при дивите свине по области през 2012 г.

ОБЛАСТ	БРОЙ ПОЛОЖИТЕЛНИ
Сливен	4
Разград	2
София	11
Благоевград	10
Пловдив	8
Враца	9
Хасково	4
Ямбол	2
Силистра	3
Стара Загора	3
Кюстендил	4
Габрово	2
Кърджали	2
Шумен	11
ОБЩО	75



Разпространение на трихинелозата при дивите свине по области през 2013 г.

ОБЛАСТ	БРОЙ ПОЛОЖИТЕЛНИ
Сливен	6
София	10
Благоевград	13
Пловдив	4
Враца	9
Смолян	4
В. Търново	3
Стара Загора	4
Кюстендил	4
Габрово	1
Кърджали	5
Шумен	16
ОБЩО	79



Разпространение на трихинелозата при дивите свине по области през 2014 г.

ОБЛАСТ	БРОЙ ПОЛОЖИТЕЛНИ
Сливен	19
София	10
Благоевград	15
Пловдив	11
Враца	5
Смолян	4
В. Търново	1
Стара Загора	1
Кюстендил	3
Габрово	1
Кърджали	3
Хасково	1
Варна	1
Шумен	6
ОБЩО	81



Разпространение на трихинелозата при дивите свине по области през 2015 г.

ОБЛАСТ	БРОЙ ПОЛОЖИТЕЛНИ
Сливен	27
Ловеч	12
София	11
Благоевград	9
Пловдив	9
Враца	8
Русе	5
Стара Загора	3
Смолян	2
Велико Търново	1
Хасково	1
Търговище	1
ОБЩО	89



Разпространение на трихинелозата при дивите свине по области през 2016 г.

ОБЛАСТ	БРОЙ ПОЛОЖИТЕЛНИ
Сливен	14
Ловеч	7
София	6
Благоевград	11
Пловдив	12
Враца	1
Русе	3
Стара Загора	1
Велико Търново	1
Габрово	1
Кърджали	6
Шумен	1
ОБЩО	64



Разпространение на трихинелозата при дивите свине по области през 2017 г.

ОБЛАСТ	БРОЙ ПОЛОЖИТЕЛНИ
Сливен	15
Ловеч	8
София	13
Благоевград	25
Пловдив	19
Враца	5
Шумен	6
Русе	2
Кърджали	5
Стара Загора	4
Велико Търново	1
Тутракан	7
Търговище	2
ОБЩО	112



- Брой проби от диви свине, изследвани за трихинелоза през 2016 г. – 17 537
- Брой положителни – 64
- Трихинелоносителство – 3,65/1000
- Брой проби от диви свине, изследвани за трихинелоза през 2017 г. – 14606
- Брой положителни – 112
- Трихинелоносителство – 7,69/1000

- 2018 – ???